

SERIE NUMERICHE

Esercizi proposti

1. Applicando la definizione di convergenza di una serie trovare il carattere delle seguenti serie, e, in caso di convergenza, trovarne la somma:

$$\begin{aligned}
 a) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + n} && [S_n = 1 - \frac{1}{n+1} ; S = 1] \\
 b) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{4n^2 - 1} && [S_n = 3 \left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) ; S = 3] \\
 c) \quad & \sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) && [S_n = \sqrt{n+1} ; S = +\infty]
 \end{aligned}$$

2. Verificare (utilizzando la condizione necessaria per la convergenza) che le seguenti serie divergono:

$$\begin{aligned}
 a) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1} && b) \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2^{\frac{1}{n}} \\
 c) \quad & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^{1/n}} && d) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{n^2 + 1} \\
 e) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n && f) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n n^2}
 \end{aligned}$$

3. Utilizzando la serie geometrica, discutere il comportamento delle serie seguenti e calcolarne la somma:

$$\begin{aligned}
 a) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n+1}}{\pi^n} && [S = \frac{9}{\pi-3}] \\
 b) \quad & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(1 + \alpha^2)^n} && [\text{conv. per } \alpha \neq 0 ; S = \frac{1+\alpha^2}{2+\alpha^2}] \\
 c) \quad & \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{\alpha}\right)^n && [\text{conv. per } \alpha > \frac{3}{2} ; S = \frac{\alpha}{3}]
 \end{aligned}$$

4. Utilizzando i criteri del rapporto, della radice, del confronto e del confronto asintotico, dire se le seguenti serie (a termini positivi) convergono:

$$\begin{aligned}
 a) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{2^n} && [\text{conv.}] && b) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^5}{n!} && [\text{conv.}] \\
 c) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^5} && [\text{div.}] && d) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n n!}{n^n} && [\text{div.}] \\
 e) \quad & \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n+1}{3n-1}\right)^n && [\text{conv.}] && f) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\log n)^{n/2}} && [\text{conv.}] \\
 g) \quad & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 + \cos n}{n} && [\text{div.}] && h) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n + n} && [\text{conv.}] \\
 i) \quad & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\log n} && [\text{div.}] && l) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sin \frac{1}{n}\right)^2 && [\text{conv.}] \\
 m) \quad & \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n - \sqrt{n}} && [\text{div.}] && n) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|\sin n + \cos n|}{n^3} && [\text{conv.}] \\
 o) \quad & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5n-1}{3n^2+2} && [\text{div.}] && p) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n^3+1} && [\text{conv.}] \\
 q) \quad & 1 + \frac{1}{5} + \frac{1}{9} + \frac{1}{13} + \frac{1}{17} + \dots && [\text{div.}] && r) \quad \frac{1}{8} + \frac{2}{27} + \frac{3}{64} + \frac{4}{125} + \dots && [\text{conv.}]
 \end{aligned}$$

5. Utilizzando il criterio di Leibniz, indagare sulla convergenza semplice e assoluta delle seguenti serie:

- a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{2^n}$ [conv. ass.]
- b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [conv. ass. se $\alpha > 1$; conv. semp. se $\alpha > 0$]
- c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n^2+1}$ [conv.]
- d) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n}+2}{n^2+1}$ [conv. ass.]
- e) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\log n}{2n-1}$ [conv.]
- f) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\log n+1}$ [conv.]
- g) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right)$ [conv. ass.]
- h) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{37}}{(n+1)!}$ [conv. ass.]
- i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin((2n+1)\frac{\pi}{2})}{(2n+1)^2}$ [conv. ass.]
- l) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \log n}$ [conv.]

6. Utilizzando il criterio di MacLaurin discutere il comportamento delle seguenti serie:

- a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n} \log n}$ [conv.]
- b) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha \log n}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [conv. se $\alpha > 1$]
- c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\log n)^\alpha}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [conv. se $\alpha > 1$]
- d) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\alpha n}}{n^2+1}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [conv. per $\alpha \geq 0$]
- e) $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2+1)\alpha^n$, $\alpha \geq 0$ [conv. se $0 \leq \alpha < 1$]
- f) $\sum_{n=1}^{+\infty} n^{\alpha-\frac{1}{2}}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ [conv. se $\alpha < -\frac{1}{2}$]

7. Utilizzando il teorema di MacLaurin provare che la seguente serie converge e trovare un maggiorante e un minorante per la somma.

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} \quad \left[\frac{1}{e} < S < \frac{2}{e}\right]$$

8. Utilizzando le maggiorazioni derivanti dal teorema di MacLaurin stimare il numero di termini necessario per calcolare la somma della serie seguente commettendo un errore trascurabile rispetto a 10^{-4} .

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^5} \quad [n \geq 8]$$

9. Date le seguenti serie, dopo aver dimostrato che convergono, calcolare un'approssimazione delle rispettive somme a meno di 10^{-2} .

- a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log^3 n}$ [$n \geq 1178$]
- b) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n \log^3 n}$ [$n \geq 9$]